

الجودة
في كل
قطرة

جليفوتوكس 48% SL

GLYPHOTOX 48% SL

قاهر الحشائش



يوصى باستخدام **بشپوري TK1** عند الرش



AIMCO PESTICIDES

AIMCO

ASK TRADE



مبيد حشائش جهازي غير إختياري يستخدم لمكافحة الحشائش الحولية والمعمرة في محاصيل الفاكهة ذات النواة الحجرية بمعدل ٢.٥ لتر / فدان وذلك باستخدام بشبوري TK1 .

جليفوتوكس
GLYPHOTOX SL 48%

المادة الفعالة : جليفوسات أيزوبروبيل أمونيوم في صورة مركز قابل للذوبان في الماء
رقم التسجيل بوزارة الزراعة ٢٣٩٢ فترة ما قبل الحصاد PHL ١٠ أيام

مميزات وخصائص جليفوتوكس

جليفوتوكس : مبيد حشائش جهازي غير إختياري بعد الإنبات .
جليفوتوكس : ذو كفاءة عالية يستخدم على نطاق واسع للقضاء على الحشائش الرفيعة وعريضة الأوراق الحولية والمعمرة في حدائق الفاكهة والمواالح والحلويات والعنب والأراضي الغير مزروعة بالمحاصيل وعلى حواف الترع والمساقى .

جليفوتوكس : مبيد جهازي يمتص عن طريق المجموع الخضري للحشائش النامية وينتقل مع العصارة النباتية إلى الجذور والريزومات ويقضي عليها .
جليفوتوكس : تظهر الأعراض لتأثير المبيد على الحشائش الحولية بعد ١ - ٢ أسبوع من عملية الرش وعلى الحشائش المعمرة بعد ٢ - ٤ أسابيع حيث تذبل الحشائش ثم تصفر وتجف وتموت .

جليفوتوكس : يستخدم بواسطة أجهزة الرش المختلفة سواء رشاشات ظهريّة أو مواتير رش .
جليفوتوكس : ليس له أثر باقٍ في التربة حيث يتحلل سريعاً بواسطة الكائنات الحية الدقيقة بالتربة .

طريقة تأثير الجليفوتوكس

جليفوتوكس : مبيد حشائش مثبط لبناء الأحماض الأمينية العطرية للحشائش حيث تعمل مادة الجليفوسيت على تثبيط إنزيمات مهمة لإنتاج الأحماض الأمينية العطرية (التريبتوفان - التيروسين - الفينيل ألانين) لذا يرش في مرحلة النمو الخضري للحشائش (فترة تكوين الأحماض الأمينية) .
جليفوتوكس : سهل الإمتصاص عن طريق المجموع الخضري للحشائش وينتقل عن طريق العصارة النباتية إلى جميع الأجزاء الأخرى مثل الجذور والريزومات ويثبط بناء البروتينات وتؤدي إلى القضاء على الحشائش ولا تنمو مرة أخرى .

توصيات وزارة الزراعة

رقم	المحصول	الأفـه	معدل الإستخدام
١	الفاكهة ذات النواة الحجرية (الخوخ)	الحشائش الحولية والمعمرة	٢.٥ لتر / فدان باستخدام بشبوري TK1

توصيات وإستخدامات أخرى

رقم	المحصول	الأفـه	معدل الإستخدام
١	العنب	الحشائش الحولية والمعمرة	٢.٥ لتر / فدان
٢	المواالح وحدائق الفاكهة ذات النواة الحجرية جسور الترع والمصارف	الحشائش الحولية والمعمرة	٢.٥ لتر / فدان
٣	النجيل	عندما يكون النجيل بارتفاع ١٠ - ١٥ سم وقبل مرحلة التزهير	٢.٥ لتر على ١٢٥ لتر ماء مع بشبوري TK1
٤	السعد	بعد العزيق والري عندما يصل إرتفاع السعد إلى ١٠ - ١٥ سم	٢.٥ لتر على ١٢٥ لتر ماء (رشّة أولى) ١.٥ لتر على ١٥٠ لتر ماء (رشّة ثانية) إذا إحتاج الأمر بعد ٢-١ شهر من الرشّة الأولى
٥	جميع الحشائش الأخرى مثل الحلفا والعليق	يجب أن تكون الحشائش المراد رشها في حالة نمو خضري كامل وفي نشاط	٤ لتر على ٢٠٠ لتر ماء



AIMCO PESTICIDES LIMITED
H.O.: AIMCO HOUSE, 8th Road, P.B. NO. 6822,
Santacruz (E), Mumbai - 400 055, (India)
Tel.: +91-22-6760 4000 Fax: +91-22-6760 4060/70
E-mail: aimco@aimcopesticides.com
WebSite: www.aimcopesticides.com

شركة أسك تريد للاستيراد والتصدير والتجارة
العنوان: ٤٥ شارع البيني - المريوطية - الهرم - الجيزة
تليفون: ٠١٠١٣٣٧٦ - ٠١٥٢٠٦٢٢
٠٢٣٣٠٢٣٧٠ - ٠١٥٨٢٥٨٢٢٨ فاكس:
البريد الإلكتروني: info@asktrade-egypt.com
asktrade_egypt@yahoo.com
الموقع الإلكتروني: www.asktrade-egypt.com

