

ASKOCINE

اسكوسين

مركب فسيولوجي محفز للإزهار وزيادة العقد وزيادة حجم الثمار

المكونات :

2.13g/L	Sodium ortho-nitrophenolate
3.05g/L	Sodium para nitro phenolate
1.05g/L	Sodium 5 nitro quai cholate
25.53g/L	(NAA)



العبوات: ١٠٠ سم³ - ٢٥٠ سم³

مسجل بوزارة الزراعة المصرية برقم تسجيل: ٢٣٣٧

بلد المنشأ: تركيا

شركة أسك تريد للإستيراد والتصدير والتجارة

العنوان : ٤٥ شارع الليبي - المريوطية - الهرم - الجيزة

تليفون : ٠١٠٠١١٣٣٧٠٦ - ٠١١٥٢٠٠٦٦٢٢ - ٠١٠٢٠٢٥٣٥٥٣ - ٠١١٥٨٢٥٨٢٢٨ - فاكس : ٠٢٣٣٠٢٣٢٧٠

asktrade_egypt@yahoo.com

البريد الإلكتروني : info@asktrade-egypt.com

www.asktrade-egypt.com



اسكوسين

مميزات اسكوسين :-

- * منظم نمو نباتي عباره عن خليط من 3 انواع من منظمات النمو النباتيه لزيادة وتنشيط عقد الازهار وتثبيت الثمار وزيادة حجمها مع تحسين نمو النبات وزيادة مقاومته لظروف الصقيع .
- * قابل للخلط مع معظم المبيدات والاسمده الورقيه ولايوصى بخلطه مع منظمات النمو الاخرى او المنتجات القلويه أسكوسين : مركب فسيولوجي محفز للإزهار وزيادة العقد وزيادة حجم الثمار .
- يستعمل أثناء فترة الإزهار - يستعمل لمكافحة البرودة العالية والصقيع : حيث يقلل من تأثير العوامل الجوية المعاكسة .
- يستخدم لتقليل التساقط الطبيعي لثمار التفاح .
- يستخدم لتقليل ظاهرة تكتل الشماريخ الزهرية في المانجو .
- يستخدم لتنشيط النمو الخضري في : الخيار - الطماطم - البطيخ - الكانلوب - الفلفل - الباذنجان - الفاصوليا - البسلة .
- يزيد مقاومة الفراولة للصقيع ويزيد من نسبة العقد .
- تساعد مادة النفثالين أسيتك أسيد على تقليل التأثير الضار للصقيع أثناء التزهير .
- يستخدم كمنظم نمو نباتي لتثبيت الأزهار وزيادة نسبة عقد الثمار .
- يخلط مع معظم الأسمدة والمبيدات ماعدا منظمات النمو الأخرى .
- يستخدم علي جميع أنواع المحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة رشاً علي المجموع الخضري أو تغمس فيه البذور .

معدل وتوقيت الإستخدام :

م	المحصول	معدل الإستخدام	توقيت الإستخدام
1	محاصيل الخضر : زيادة العقد (الطماطم - البطيخ - الكانلوب - الخيار - الفلفل - الفاصوليا البسلة - الباذنجان)	50 سم ³ / 100 لتر ماء	من 2 3- معاملات : الأولى بداية التزهير ويكرر الرش كل 10 أيام وفي حالة الشتلات يتم الرش بعد الشتل 8 - 10 أيام
2	المحاصيل الحقلية : الفول البلدي (لزيادة العقد ومقاومة الصقيع) اللوبيا (لزيادة العقد)	50 سم ³ / 100 لتر ماء	الأولى مع بداية التزهير والثانية بعدها 10 أيام
3	المواالح (لزيادة العقد وتقليل تساقط ما بعد العقد) المانجو (لتقليل ظاهرة تكتل الشماريخ الزهرية و تقلل تساقط ما بعد العقد)	50 سم ³ / 100 لتر ماء	الأولى مع بداية التزهير والثانية قبل سقوط بتلات الأزهار
4	الفاكهة تفاح - كمثرى (لزيادة العقد)	50 سم ³ / 100 لتر ماء	الأولى قبل الإزهار بإسبوعين والثانية قبل سقوط بتلات الأزهار ويراعى أن تكون الفترة بين كل معاملتين 10 أيام